

Zadania z analizy matematycznej; Zjazd 5 27.11.2010

Dla następujących funkcji proszę znaleźć wartość największą i najmniejszą (jeśli nie istnieją wtedy odpowiednio kres górny i dolny), lokalne ekstrema, przedziały monotoniczności i naszkicować wykres:

- | | |
|--|--|
| <p>1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 3, \quad x \in [0, 3]$</p> <p>2. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 45x + 7, \quad x \in [-6, 6]$</p> <p>3. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 45x + 7, \quad x \in (-10, 10)$</p> <p>4. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 5, \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>5. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 5, \quad x \in [-4, 4]$</p> <p>6. $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + 5, \quad x \in [-3, 3]$</p> <p>7. $f(x) = 2x + \ln x + 3, \quad x \in [2, \infty)$</p> <p>8. $f(x) = x^2 - 8x + 6 \ln x + 4, \quad x \in [\frac{1}{2}, 4]$</p> <p>9. $f(x) = x^2 - 14x + 20 \ln x + 1, \quad x \in (1, 6)$</p> <p>10. $f(x) = x^2 - 10x + 2 \ln x^4 + 3, \quad x \in [\frac{1}{2}, 5)$</p> <p>11. $f(x) = x - e^x + 2, \quad x \in [-1, 1]$</p> <p>12. $f(x) = e^2x - e^x + 4, \quad x \in [-3, 3]$</p> <p>13. $f(x) = 2x^2 - \ln x, \quad x \in (0, \infty)$</p> <p>14. $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 3}, \quad x \in [4, 10]$</p> <p>15. $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 3}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$</p> <p>16. $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 2}{x - 1}, \quad x \in [2, 6]$</p> <p>17. $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 3}, \quad x \in [6, 10)$</p> | <p>18. $f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 1}{x - 3}, \quad x \in (7, 12]$</p> <p>19. $f(x) = \cos x + x, \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>20. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}), \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>21. $f(x) = x^2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>22. $f(x) = \frac{x}{\ln x}, \quad x \in (0, \infty)$</p> <p>23. $f(x) = 2x^3 - x^2, \quad x \in (-3, 3)$</p> <p>24. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5, \quad x \in [-2, 2]$</p> <p>25. $f(x) = \frac{x - 1}{x + 1}, \quad x \in [0, 4]$</p> <p>26. $f(x) = \sqrt{100 - x^2}, \quad x \in [-6, 8]$</p> <p>27. $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1 - x}{1 + x}, \quad x \in [0, 1]$</p> <p>28. $f(x) = x - \ln(1 + x), \quad x \in (-1, \infty)$</p> <p>29. $f(x) = x - \ln(1 + x^2), \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>30. $f(x) = x \sin x + \cos x - \frac{x^2}{4}, \quad x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$</p> <p>31. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 8}, \quad x \in \mathbb{R}$</p> <p>32. $f(x) = x^2 - 3x + 2 , \quad x \in [0, 3]$</p> <p>33. $f(x) = x^2 - 5x + 6 , \quad x \in [0, 4]$</p> |
|--|--|

1. Jaki prostokąt o obwodzie 36 cm ma najkrótszą przekątną?
2. Ze wszystkich trójkątów, dla których suma wysokości i podstawy jest równa b wybrać trójkąt o największym polu.
3. W okrąg o promieniu R wpisano trapez, którego podstawą jest średnica okręgu. Dla jakiego kąta przy podstawie trapezu pole trapezu jest największe?
4. Na paraboli $y^2 = 4x$ znaleźć punkt leżący najbliżej prostej o równaniu $y = 2x + 4$. *Uwaga: najprostsze rozwiązanie tego zadania nie polega na badaniu ekstremów funkcji.*
5. Dany jest prostopadłościan o podstawie kwadratowej i powierzchni całkowitej P . Jakie powinien mieć wymiary by jego objętość była największa.
6. Dane jest pudełko w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratowej, bez wieczka. Powierzchnia całkowita pudełka wynosi P . Jakie powinno mieć wymiary by jego objętość była największa.
7. Ze wszystkich stożków o danej tworzącej l wybrać ten, który ma największą objętość.
8. Znaleźć stosunek R/H promienia podstawy do wysokości walca, mającego przy danej objętości V najmniejszą powierzchnię całkowitą.
9. Stoimy w odległości 5 km od prostoliniowej szosy i 13 km od domu stojącego przy tej szosie. Jaki jest minimalny czas dojścia do domu jeśli w terenie poruszamy się z prędkością 3 km/h a po szosie z prędkością 5 km/h?
10. Statek pływa od portu do portu. Koszt ruchu statku składa się z dwóch części: niezależnej od prędkości i równej 25000 zł dziennie oraz zależnej od prędkości i równej (liczbowo, dziennie) sześciastokrotności prędkości wyrażonej w km/h. Przy jakiej prędkości koszt przeplłynięcia trasy jest najmniejszy?